

Smør- og Fedtmosen 1999

Hermed følger fugle - og planteobservationer fra Smør - og Fedtmosen 1999, hovedsagligt baseret på observationer af Peter Godtfredsen og undertegnede. Skulle nogen have tilføjelser til denne rapport om fuglelivet i mosen, modtages disse med varm tak.

En tak til Erik Agertoft og Jan D. Pedersen som har bidraget med obs. til denne rapport.

Frank Desting
Naturgruppen
Herlev 1999

E-mail ; dex@post8.tele.dk

Januar & februar

Igennem januar og februar sås 2 - 4 fouragerende **Fiskehejrer** i mosen, 12.2 trak 10 **Sangsvaner** (fåtalig træk - og vintergæst) over mosen, **Knopsvanen** blev (i isfri perioder) set med 1 par primo januar, 2 par i kamp ult. januar, 1 par gennem første halvdel af februar i en våge, hele 3 par sås 20.2 og 2 par 27.2, iøvrigt 1 trk. S 12.2. Der foreligger en enkelt januar-obs. af **Grågås**, nemlig 20.1 2 rst. (første januar-obs. nogensinde!) og fra februar flg. ; 2.2 1 trk., 5.2 1 trk. N, 12.2 1 trk. NØ, 20.2 2, 27.2 7 trk., ult. februar 28 trk. **Gråand** sås med max 40 - 50 ind. igennem januar, ca. 70 ind. primo februar og ca. 120 medio februar. Ult. januar max 8 rst. **Troldænder** og 2 rst. primo februar (isfri perioder) - den 3.2 trak 1 han af **Stor Skallesluger** over mosen (fåtalig træk- og vintergæst). Af **rovfugle** sås 1 han **Duehøg** (fåtalig vintergæst) rst. 9.1 - og en **Ringdue** (eller rettere sagt resterne deraf) sås 27.1 (formentlig fortæret af **Duehøg**) - sidste obs. i perioden blev gjort 18.2 med 1 hun jag. og 1 han rst., **Spurvehøg** sås med 1 gennem januar og 2 gennem februar, **Musvåge** overvintrede med 2

gennem januar og 3 gennem februar, første trk. sås 22.2 9 trk. og 27.2 med 2 trk., den juv. **Fjeldvåge** (fra 9.11 1998) sås ved stort set hvert besøg gennem januar og februar ud (iøvrigt første overvintrende gennem en årrække), to obs. af en "brun" **Blå Kærhøg** blev det til (ligeledes sjælden vintergæst); nemlig 10.2 1 mobbet af **Krager** og 20.2 1 jag. på markarealet, **Tårnfalk** sås med 1 - 2 gennem januar og 1 - 2 par gennem februar (parringsleg fra 20.2). **Blishøne** sås med 1 ind. primo januar, flere ult. januar (territoriekampe påbegyndt), få primo og medio februar (da mosen atter frøs til), iøvrigt hørt trk. fra nattehimlen pr. 6.2, de første **Viber** sås 3.2 5 trk. og 28.2 35 trk., af **måger** sås max 200 rst. **Stormmåger** i januar - og ligeledes alm. i februar, gennem hele perioden også nogle **Sølvmåger** og 1 subadult **Svartbag** rastede 27.1 (sjælden gæst), alm. var også **Hættemåge**. Nogle **Ringduer** (ikke større tal) gennem perioden og 1 **Tyrkerdue** sås flyve ind over mosen hhv 2.2 og 27.2. **Stor Flagspætte** opholdt sig med 2 ind. (trommende fra 1.1!) i hele perioden, - de første **Sanglærker** sås 20.2 14 trk. + 1 syng. (ifm mildt vejr) og 21.2 6 trk., samt hele omkring 100 trk. på 1/2 time 27.2. **Gråkrage** fouragede på markerne med op til ca. 200 ind. gennem hele perioden (hertil skal nævnes, at der fast holder et fåtal af "vingebåndskrager" til - formentlig partiel albinistiske fugle, samt at 1 helt sort, dvs med anstrøg af gråt på bugen sås rst. 3.2 - hybrid ?), omkring cirka 100 **Råger** holdt til i samme periode - desuden 250 - 300 **Alliker** fast (også her er der igennem januar set en med hvide vingebånd), **Husskade**; almindelig, f.eks minimum 250 til overnatning talt den 5.2 og **Skovskade** sås med ca. 5 ind. gennem januar, ca. 12 ind. gennem februar, herudover 1 trk. S den 27.1. Af **mejser** sås bl.a. **Sumpmejse** med max 1 i januar, 2 - 3 syng. fra primo februar, **Halemejse** med 15 - 20 ind. i januar og ca. 5 i februar. **Træløber** blev set regelmæssigt med 1 gennem januar og 1 - 2 ind. gennem februar, iøvrigt var **Gærdesmutte** og **Rødhals** karakterfugle gennem januar og februar, ligesom **Solsort** (påbegyndt morgensang pr. 21.2), **Sjagger** sås i pæne tal rst.; ca. 100 gennem januar og 300 - 500 rst. gennem februar, derimod yderst få **Vindrosler** i januar, ligeledes yderst få/ingen i februar, **Fuglekonge** sås regelmæssigt i hele perioden med få ind., max 6 ind. Den første **Jernspurv** hørtes syng. 18.2 1 syng. og 20.2 1 syng., - **Silkehaler** blev noteret som flg.; 10.1 15 - 20 rst., 29.1 ca. 25 rst., 7.2 25 trk., 12.2 25 trk., 18.2 ialt ca. 100 ind. fordelt på flere flokke. De første **Stære** ankom 24.2 6 rst. og 27.2 4 rst. Af **finker** sås **Kernebider** blot een gang 20.2 1 og **Stillits** var regelmæssig med en mindre flok på ca. 10 - 12 ind. hele perioden, **Grønsisken** sås i flere småflokke perioden ud med max i flok ca. 60 gennem januar og max ca. 40 i februar, **Gråsisken** sås regelmæssigt i hele perioden, men kun med få rst., dvs max 5, **Dompap** derimod i pæne tal; over 10 rst. gennem januar, alm. gennem februar, f.eks 40 rst. optalt primo februar, få **Bogfinker** gennem jan. og febr., dog flere fra 20.2 (nu syngende) og **Kvækerfinke**; alle obs. nævnes; 3.2 1 rst., 11.2 og 12.2 få rst. samt 20.2 8 rst. var alt. Fåtalig var også **Gulspurv**, hvorfor alle obs. nævnes; 5.1 1 rst., 3.2 1 rst., 18.2 1 rst., 20.2 1 rst. og 4 rst. 27.2

Marts, april & maj

Lille Lappedykker ankom 25.3 1 hørt, og hørtes med kun op til 2 "trillende" gennem marts, april og maj; skøn 2 ynglepar (bunden er nået!), **Gråstrubet Lappedykker** ankom 18.3 1 og 20.3 1 par i Smørmosen, fra dette par sås og hørtes parringspil fra ult. marts, rugende gennem april/maj og ult. maj kom parret med 3 unger. Herudover sås i Fedtmosen, fra 26.3 gennem april - til 6.5 1-2 rst. **Skarv** sås (som vanligt) med flere ovfl.; 8.3 2 NØ, 25.3 2 SØ, 3.4 2 NV + 1 NØ, 23.4 1 S og 1.5 2 N. **Fiskehejre**

sås fouragerende med 2-4 ind. i marts, op til 5 ind. i april og 1-3 ind. gennem maj. To gange sås 2 **Sangsvaner** (fåtallig trækgæst) trk. N, nemlig hhv 17.3 og 18.3 og **Knopsvane** sås med op til 4 par gennem marts, 2-4 par gennem april hvor 2 par havde bygget rede, op til 4 par gennem maj - dog blot 1 par med ynglesucces i Smørmosen, fik 7 pull. Af rst. **Grågæs** sås 1 par 3.3 og 14.3, herefter regelmæssig med 8 rst. medio marts, 4 rst. ult. marts (herudover 12 trk. 18.3). Herefter ikke set til 25.4 hvor 2 sås rst. - disse april ud og fra maj regelmæssig med 4-5 rst. primo og 2 rst. medio maj - set til 16.5, herefter ingen, dvs ej heller nogle ynglepar d.å. En lokal sjældenhed er 1 **Mørkbuget Knortegås**, som oven i købet blev set rst. i perioden 8-10.4 - og ligeledes sjælden gæst er **Bramgås** med 150-200 trk. 22.4. **Gråand** blev set med 30-40 ind. spredt rundt omkring i mosen ifm isfrit medio marts, alm. spredt på ynglepladserne gennem april og set med pull. fra 5.5, min. 10 ynglepar. Fåtallig trækgæst er **Taffeland** som sås med 1 par hhv 13.3 + 14.3 + 5 rst. 23.3, alm. trækgæst er dog **Troldand** som sås med max 6-8 rst. primo marts, 17 rst. medio marts, 10 rst. ult. marts, 17 rst. primo og ult. april, 7 rst. primo og medio maj og 2-4 rst. ult. maj. Fåtallig trækgæst er **Stor Skallesluger** som blot blev set med 1 han ovfl. 8.3 og 3 ovfl. 14.3. Af "**rovtøj**" sås i perioden **Hvøpsevåge** - hvor blot een pæn trækdag var 16.5 hvor 75 sås trk., herefter blot 7 trk. 22.5, **Duehøg** (fåtallig trækgæst) sås flere X ; 2.3 1 han rst., 11.3 1 hun trk., 26.3 1 + 1 trk., 4.4 1 hun trk., 19.4 1 og 3.5 1 trk. N, **Spurvehøg** sås med få trk. i perioden primo marts/primo april - samt op til 4 rst. i marts og 1 rst. i april, fra maj blot 1 hhv 14.5 og 16.5 (ses normalt ganske tilfældigt i ynglesæsonen med mindre den yngler i mosen), **Musvåge** optrådte således ; marts : 3-5 rst., (iøvrigt, gennem marts op til 2 par i parringsleg over mosen) - samt trk. fra 18.3 8 trk., 19.3 min. 100 trk., ult. marts noget træk, april : 2 rst. til og med medio april samt få trk. primo april og sidste trk. 23.4 1, maj : regelmæssig gennem hele maj måned med normalt 1-2 rst. (dog 5 rst. og i parringsflugt 6.5) - samt sidste trk. 2.5 1, den stationære rst. juv. **Fjeldvåge** (fåtallig træk - og vintergæst) sås ved stort set hvert besøg gennem hele marts til og med 23.4, oftest sås den fouragere på markarealet omkring Kildegården, iøvrigt yderligere 1 ad. hun rst. 25.3 samt 1 på direkte træk i april, den fåtallige trækgæst **Rørhøg** sås ; 3.4 1 hun trk. + 1 han jag., 14.4 1 han rst., 21.4 1 han rst./trk., 28.4 1 trk. NØ samt 1 han 24.5., og den ligeså fåtallige **Fiskeørn** sås trk. N på flg. dage 2.4 1, 4.4 1 NØ, 9.4 1 og 23.4 1, en lokal sjældenhed er 1 trk. **Lærkefalk** 20.5 samt 1 trk. **Dværgfalk** (fåtallig trækgæst) 10.4, almindeligt optrædende er dog **Tårnfalk** med 2 par ved 3 falkekasser fra marts til april (meget aktive), dog blot 1 par gennem maj ; formentlig 1 ynglepar. **Fasan** hørtes kaldende fra 27.3 - april og maj ud ; 1-3 ind. (hannen sås ligeledes et par gange), skøn 2 ynglepar, meget tidligt - og sent sås **Trane** (trækgæst) ; nemlig 3.3 med en flok på ca. 35 trk. NØ og 13.5 4 trk. NØ, **Vandrikse** ankom 18.3 1 hørt og frem til primo maj hørtes blot max 3-4 ind. ; skøn max 4 ynglepar, **Grønbenet Rørhøne** var alm. fra medio marts (isfrit) og alm. ynglende perioden ud, dog ikke nærmere optalt, **Blishøne** ligeledes en del ifm isfrit primo/medio marts og perioden ud - alm. ynglende, med pull. fra 2.5. Af **vadere** sås **Vibe** regelmæssigt med 1-2 rst. i marts (+ 1 trk. 26.3), herefter udeblev den til 28.4, hvorefter den igennem hele maj måned sås med 1-3 rst. og fra ult. maj udviste yngleadfærd ; parringsflugt og bortjagen af potentielle predatorer; 1 sent ynglepar ? Fåtallige trækgæster er **Svaleklire** med 1 meget tidlig ; 20.3 1 samt 1 rst. 30.5 og **Dobbeltbekkasin** med 10.5 1 rst., i hele perioden var **Stormmåge** almindelig, **Sølvmåge** i noget mindre antal, men nu mange **Hættemåger**, f.eks flere hundrede rst. april, ligeledes alm. var **Ringdue** ; en del rst. i marts, april og maj - flest hele maj med op til ca. 500 rst. på markarealerne, iøvrigt trk. flokke fra primo marts - medio marts og lidt træk ultimo marts, herudover en del ynglepar rundt omkring i mosen, **Tyrkerdue** blev noteret 25.4 3 flyv. og 29.5 1 kurrende fra have op til mosen, **Gøgen** ankom 3.5 1 kukkende og fra medio maj flere - op til 5 kukkende ult. maj (skøn 3-5 "ynglepar"), **Mursejler** ankom 6.5 1 - fra ult. maj flere hundrede fouragerende i området, sjælden gæst

er 1 **Sortspætte** trk. S den 19.3, men **Stor Flagspætte** optrådte alm.; 1-2 ind. i marts, 2 par i april (trommende), 2-3 ind. igennem hele maj (trommende til og med primo maj) ; formentlig 2 ynglepar. Fåtalig trækgæst er **Hedelærke** som noteredes hhv 17.3 1 trk., 18.3 1+1 trk. og 25.3 1 trk., derimod en hel del **Sanglærker** ; gennem første halvdel af marts mange rst./trk. (syng. fra medio marts), noget træk/rast ult. marts, og gennem hele april få rst./trk. samt ca. 5 syng. over mosen ult.april, gennem hele maj 2-5 syng ; skøn 2 - max 5 ynglepar. **Landsvalen** ankom tidligt i år ; 16.4 1, herefter 23.4 få og fra ult.april flere, alm. fra primo maj, flere hundrede fouragerende fra ult. maj, yngler iøvrigt fåtaligt på gårde i området, 27.4 ankom så **Bysvale** 2, nogle gennem maj og ult. maj flere hundrede fouragerende, **Digesvale** (fåtalig trækgæst) sås blot med nogle ind. 14.5. En sjælden gæst er 1 ovfl. **Ravn** den 23.4, alm. **kragefugle** iøvrigt var **Gråkrage** ; alm. i hele perioden, f.eks 100 rst. maj, omkring 5 ynglepar, få "vingebåndskrager" sås i hele perioden, af trk. **Krager** sås noget træk medio/ult.marts, **Råge** forekom alm. i hele perioden med ca. 100 fouragerende ind. samt få ynglefugle ved Klausdalsbrovej umiddelbart op til området, **Allike** sås ligeledes almindeligt i hele perioden, med f.eks flere hundrede ind. fouragerende gennem april/maj, 1 par sås iøvrigt i uglekasse i marts/april ; muligt 1 ynglepar, **Husskade** ; meget alm. fouragerende og en hel del ynglepar (den 9.4 sås iøvrigt 1 eks. med ren hvid ryg, øvrige dragtkarakterer som **Husskade**), **Skovskade** sås med ca. 5 ind. i marts, ca. 6 ind. i april (til medio april), ult.april og gennem hele maj få ind., max 4 ind. den 12.5 ; formentlig 1-2 ynglepar. **Sumpmejse** var regelmæssig med 1-2 syng. gennem hele marts og først i april, max 4 syng. ult.april, og fra maj blot 1 hhv 2.5 og 16.5 ; formentlig få ynglepar, **Halemejsen** forekom i større tal ; max 15 ind. gennem marts, ca. 5 gennem april, regelmæssig gennem maj med max ca. 6 ind., set og hørt 3 steder medio maj ; omkring 3 ynglepar, 1 kaldende **Pungmejse** noteredes 5.5 (sjælden gæst). **Træløber** var regelmæssig fra primo marts til medio april med 1-2 ind. (hørtes syng. 28.3) - sidste noteret 14.4. Alm. ynglefugle er **Gærdesmutte** (skøn 20-25 ynglepar) og **Rødhals** (skøn 15 ynglepar), specielt høres mange af de to sidstnævnte arter syng. først på ynglesæsonen i april, **Nattergalen** skuffede dog i år ; ankom 7.5 1 syng. - herefter alm., men meget fåtalig syng., normalt 2-3 syng. i maj, max 5 syng. 29.5 ; skøn 5 ynglepar. Den fåtalige trækgæst **Rødstjert** noteredes med 1 rst. hhv 6.5 og 10.5, **Bynkefugl** noteredes regelmæssigt i perioden 7.5 1 rst. - 22.5 1 rst., med max 5 rst. 12.5, "mange" rst. 14.5, 8 rst. 16.5, 3 rst. 19.5 - ligesom **Stenpikker** noteredes regelmæssigt i perioden 5.5 1 rst. - 28.5 1 rst., med max 3 rst. 12.5, "mange" rst. 14.5, 4 rst. 16.5, 3 rst. 19.5. Masser af **Solsorte** yngler i mosen (umulig at optælle!), og **Sjagger** yngler fortsat i pæne tal ; min. 35 ynglepar er skønnet, forekomst iøvrigt ; marts : ca. 300 rst. (syng. fra primo marts), april ; alm. på ynglepladserne, flest i Smørmosen, men også flere par i Fedtmosedelen, maj ; min. 35 ynglepar er skønnet. **Vindrossel** sås (og hørt syng.) med nogle rst. gennem hele april måned, **Sangdrossel** ankom til mosen 26.3 med 3 syng. - herefter alm. gennem april/medio maj med 3-5 syng., medio maj dog 2-3 syng. ; skøn ; 3 ynglepar, en fåtalig trækgæst er **Misteldrossel** der sås den 20.3 med 1 rst. sammen med **Sjaggere**. Af **sangere** ankom **Rørsanger** 5.5 1 syng., 6.5 2 syng., 12.5 nogle syng., 16.5 mange syng., ult.maj ca. 30 syng. ; min. 30 ynglepar, **Kærsanger** ankom tidligt, nemlig 14.5 1 syng., 16.5 1 syng., herefter blot ganske få syng. gennem maj ; få ynglepar, en sjælden trækgæst er **Sivsanger** med 1 noteret 12.5, og en fåtalig trækgæst, nemlig **Gulbug** hørt syng. 22.5, den første **Munk** hørt 23.4 2 syng. + 1 hun, herefter gik det stærkt ; ca. 15 syng. 25.4 og gennem maj ganske alm. syng. ; skøn 20-25 ynglepar, **Havesanger** ankom tidligt ; 5.5 2 syng., 6.5 3 syng. + set, herefter ganske alm. gennem maj ; skøn hele 20 ynglepar, **Tornsanger** ankom 3.5 1 syng., flere fra 7.5, alm. fra medio maj, ult.maj ; skøn 20 ynglepar, **Gærdesanger** ankom 25.4 1 syng., 27.4 "nogle", 28.4 "nogle", alm. syng. gennem maj ; flest i haver op til mosen, men også nogle ynglepar i selve mosen, **Løvsanger** hørt første gang 23.4 flere syng., 25.4

20-25 syng., alm. syng. gennem maj ; skøn 15-20 ynglepar, **Gransanger** ankom tidligt ; 18.3 1 syng., 26.3 flere syng., og herefter alm. syng. med 15-20 syng. fra primo april/medio maj, ult.maj dog færre ; skøn 15 ynglepar. **Fuglekonge** sås i perioden primo marts/primo april med max 5-8 ind., og en isoleret obs. gjordes 19.5 1, fåtallig trækgæst er **Grå Fluesnapper**, som blev noteret på flg. dage ; 12.5 2 rst., 14.5 1 rst., 16.5 4-5 rst. og 19.5 1 rst., ligeledes fåtallig trækgæst er **Broget Fluesnapper**, som noteredes 27.4 1 syng. + 28.4 1 syng., herefter 3.5 1 han og 6.5 1 syng., **Jernspurv** forekom således i perioden ; få syng. (max 8 ind.) gennem hele marts måned, flere (over 10) syng. gennem hele april, alm. syng. gennem maj ; skøn 10-15 ynglepar, **Engpiber** sås med de første 2 trk. 18.3, herefter - fra 26.3 til 1.5 dagligt få/nogle rst./trk. (max 10-15 rst./trk. 9.4) og en efternøler 12.5 1 trk., mere fåtallig var, som ventet, **Skovpiber** med blot disse obs. ; 27.4 1 trk. og 28.4 1 trk., **Hvid Vipstjert** ankom tidligt ; 8.3 3 rst., fra 14.3 - april ud regelmæssig, men fåtallig med max 3-4 ind. 5.4, ellers normalt 1-2 rst., ligeledes regelmæssig gennem hele maj med 1-2 fugle (hørt syng. 1.5), **Gul Vipstjert** noteredes 5.5 1 og 16.5 1 (fåtallig forårstrækgæst), eneste obs. af **Silkehale** (fåtallig trækgæst) gjordes 10.4 12 rst., **Rødrygget Tornskade** sås 6.5 1 rst. og 19.5 1 rst. (fåtallig trækgæst), **Stær** hørtes syng. fra primo marts, forekomst iøvrigt ; flokke på max 25 ind. primo marts, flokke på max 60 ind. medio marts, flokke på max 120 ind. ult.marts (ult.marts flere ynglepar og flere syng.), gennem april og maj alm. i småflokke + omkring 5 ynglepar, **Skovspurv** yngler idag mere alm. end tidl., idet denne art har indtaget en del opsatte kasser ; skøn ; min 15 ynglepar, af **finker** sås **Kernebider** jævnlige med 1-2 ind. (max 10 rst. 5.3 og hørt syng. 6.3 og 13.3) gennem hele marts, iøvrigt ingen, alm. syng./ynglende er **Grønirisk** med cirka 15 ynglepar, **Stillits** sås gennem hele marts med ca. 12 primo, få medio og ca. 10 ult. (syng. ult.marts), herefter sås få primo/medio april - og en isoleret obs. 28.5 1, **Grønsisken** sås i mindre flokke (max ca. 30 ind.) gennem hele marts, iøvrigt lidt egtl. træk ult.marts, ingen herefter, fåtallig var **Tornirisk** med ankomst 3.4 1 rst., 23.4 få rst., 28.4 1 samt 5.5 1, 14.5 1 og 19.5 3 var alt perioden kunne byde på, **Gråsisken** forekom fåtalligt igennem marts (med max 8 ind.), til gengæld kunne hele april opvise yngleadfærd, sangflugt mv af 2-4 par, dette fortsatte gennem maj hvor 2-3 ynglepar skønnedes (arten har med held ynglet de sidste par år i mosen), **Dompap** sås alm. gennem marts med ca. 20 ind., dog færre fra ultimo marts (iøvrigt syng. primo marts), fra april blot hørt to steder i Fedtmosedelen 9.4, og fra maj ; 6.5 1 hørt ; yngler formentlig med 1-2 par, men lever yderst skjult i ynglesæsonen, en fåtallig trækgæst er 1 **Lille Korsnæb** han rst. 9.4, alm. i hele perioden var derimod **Bogfinke** ; syng. fra primo marts + alm. rst./trk. i marts/primo april, alm. syng. i april og maj og der er skønnet omkring 20 ynglepar, **Kvækerfinke** optrådte med max 10 rst. (iøvrigt hørt syng. ult.marts) i perioden 17.3 - 29.3, fåtallig var **Gulspurv**, hvorfor alle obs. nævnes ; 3.3 1 rst., 18.3 2-3 rst. og 4.4 1 rst., **Rørspurv** ankom til mosen 3.3 2 rst., 8.3 ca. 5, 14.3 få, alm./syng. fra 17.3 - gennem april og maj 15-20 syng. ; skøn 15-20 ynglepar.

Juni , juli & august

Lille Lappedykker hørtes kun een X i juni ; 4.6 (1 syng.) og fra juli flg. ; 1.7 1 syng. + 1 juv., 18.7 1 og 24.7 1, **Gråstrubet Lappedykker** ; familien sås (fra juni nu kun med een unge) gennem hele perioden. Af **Skarv** blev flg. obs. gjort ; 7.6 1 N, 10.6 2 + 1 Ø, 23.6 1 SØ, 21.7 1 SV og 27.8 1 trk. S, **Fiskehejre** sås fouragerende med 1 - 2 ind. gennem juni, 2 gennem juli og 1 - 2 gennem august, dog 3 ind. fra ult. august, **Knopsvane**-parret der oprindeligt fik 7 pull., sås hele perioden, men antallet af unger blev reduceret til 4 unger, een obs. af **Grågås** blev det til ; nemlig en flok på ca. 30 trk. SØ 13.8,

alm. med unger + fældende ind. sås **Gråand** hele perioden og **Troldand** sås med ; juni ; 2 par primo, 1 par medio og ult., juli ; 5 ind. primo og herefter (med./ult.) 1 hun, ingen i august, og dermed ingen ynglepar. **Hvepsevåge** afsluttede forårstrækket med 1.6 få trk., 2.6 4 rst. (parringsleg), og de første i efteråret blev 20.8 7 trk., 25.8 25 trk., 26.8 1 trk. og 27.8 6 trk., **Duehøg** sås med 1 juv. hun rst. 18.7 (sjældnen sommergæst) og 1 hun kreds. 20.8 (fåtallig trækgæst), dens "lillebror" **Spurvehøgen** (som er en fåtallig sommergæst) sås som følger ; 2.6 1, 5.6 1, 17.6 1, 24.6 1, 25.6 1, 1.7 2 i leg, 25.7 1, 4.8 1, 15.8 2, 20.8 1 rst. + 1 kreds., herefter, ult. august igen regelmæssig med omkring 5 rst. + lidt trk., ligeledes fåtallig sommergæst er **Musvåge** som sås således ; 4.6 1 jag., 10.6 1 fourag., 13.6 1 kreds., 16.6 1 jag., 17.6 1 fourag., 19.6 2 i leg, 22.6 1, 24.6 1, 1.7 1 jag., 18.7 3 rst., 25.7 1, 27.7 1 jag., 13.8 1, 25.8 1, 26.8 1 rst., 26.8 1 rst., 27.8 1 jag., 30.8 3 rst. + de 2 første trk. (altså denne sommer, modsat tidl. år, ganske regelmæssig gennem sommeren) ; formentlig ynglepar fra Hareskoven, - sjældnen sommergæst (formentlig tidl. trækgæst) er 1 "brun" **Kærhøg** ; formentlig **Blå Kærhøg** med ang. 1 rst. på markarealet den 18.7 (første sommerfund fra mosen!), en meget sjældnen art er 1 **Slangeørn** som sås trk. S den 27.8 kl. 11.35 (ny art for mosen - og dermed art nr.183 ialt), 1 **Fiskeørn** trak over mosen 20.8 (fåtallig trækgæst), det blev til 1 ynglepar af **Tårnfalk** i opsat redekasse i Smørmosen ; parret sås med nyudføjne unger fra 8.7 og perioden ud sås parret med deres 3 unger jagende over markerne. **Fasan** ; 1 - 2 kaldende hanner (sås og hørtes) regelmæssigt gennem juni/juli, (formentlig 1 - 2 ynglepar), men ingen obs. fra august, **Vandrikse** hørtes kun 2 X juni/juli ; 24.6 1 og 27.7 1, gennem hele august hørt mere regelmæssigt med 1 - 2 stk. (ialt 4 gange fra 13.8 - 30.8), **Rørhøne** og **Blishøne** var alm. ynglende ; **Blishøne** alm. med unger fra juni/august (omkring 15 - 20 ynglepar/kuld), **Rørhøne** ikke optalt pga den skjulte levevis, lidt **vadere** sås ; 4.6 1 overflyvende **Strandskade** (sjældnen trækgæst), **Vibe** sås regelmæssigt gennem hele juni med 2 - 4 ind.; herefter ingen og altså ingen ynglepar d.å., **Svaleklire** (fåtallig trækgæst) sås med 1 rst. 8.7 og 1 S 16.7, ligeledes fåtallig trækgæst er **Dobbeltbekkasin** som sås med 1 flyv. 13.8, det blev til få **Stormmåger** og nogle **Sølvmåger** gennem hele sommeren, en sjældnen gæst, nemlig 1 **Sildemåge** ad. sås rst. 6.7, mens **Hættemåge** var alm. forekommende. **Ringdue** forekom således ; alm. rst. (flere hundrede) + alm. ynglende gennem juni og juli, fra medio juli og august ud jævne småflokke SV flyvende + ca. 100 rst. gennem august, **Tyrkerdue** sås hhv 7.7 1 og 13.7 (1 syng. fra have), gennem juni & juli 2 - 3 "kukkende" **Gøge**, ingen obs. i august, **Mursejler** sås med flere hundrede fouragerende gennem juni/juli, ult. juli øgning til ca. 500 rst., herefter mange første halvdel af august, færre ult. august, alle obs. af **Stor Flagspætte** nævnes her ; 4.6 3 ind., 7.6 2 (formentlig 2 ynglepar ; 1 par i Smørmosen og 1 par i Fedtmosen), 1.7 1 - 2, 6.7 1, 26.7 hørt, 13.8 1, 15.8 3 og 25.8 2. **Sanglærke** hørtes med 3 syngende gennem juni/medio juli ; skøn 3 ynglepar, herefter ingen, **Landsvale** ; alm. ynglende på gårde i området/alm. fouragerende juni/juli/august ; fra august også alm. trk., **Bysvale** ; samme forekomst som **Landsvale**, dog noget færre i antal og næppe ynglende, men alm. fouragerende hele sommeren og alm. trk. fra august, **Digesvale** (fåtallig trækgæst) sås med "nogle" hhv 25.8 og 26.8. **Gråkrage** ; alm. juni/juli, flere (mange fouragerende) fra august (i hele perioden et fåtal af "vingebåndskrager", heriblandt 1 med grønligt skær på vinge), **Råge** ; nogle gennem juni/juli, mange fouragerende fra august, **Allike** ; ganske alm. fouragerende juni/juli (+ 1 ynglepar i **Natugle**-kasse), flere hundrede fra august, mange **Husskader** med unger hele perioden, alle obs. af **Skovskade** nævnes ; 1.6 1, 10.6 1 par med unger, 17.6 juv., 7.7 hørt, 26.7 2 familier, 13.8 få, 15.8 få, 26.8 ca.5. (2 ynglepar). Både **Musvit** og **Blåmejse** sås med nogle ynglepar i kasser i selve mosen, dog flest ynglende i haver op til mosen, derfor sås begge arter alm. fouragerende gennem hele sommeren, specielt mange, med unger, fra juli måned, alle obs. af **Sumpmejse** nævnes ; 19.6 2 par med unger, 22.6 hørt, 6.7 hørt, 8.7 1-2 syng., 18.7 1, 26.7 familie, 15.8 hørt, 25.8 3-4 og 26.8 2 (altså omkring 2

ynglepar), alle obs. af **Halemejs** nævnes ; 5.6 1-2 par med unger, 7.6 1 par med unger, 19.6 ca. 2 par med unger, 22.6 2 par med unger (både nordlig og sydlig race), 1.7 1 flok, 8.7 nogle, 24.7 familie - herefter ingen til 27.8 hørt (altså omkring/min.2 ynglepar), første sommerfund af **Spætmejs** gjordes 19.6 med 1 rst./stref., **Træløber** har formentlig ynglet med 1 par, idet arten er set i både maj og juni måned, dog ingen fra juli, og fra august ; 2.8 1 og 13.8 1, alm. ynglende er både **Gærdesmutte** og **Rødhals** (set og hørt hele perioden), **Nattergal** hørtes syng. med få ind. til primo juni + 1 syng. 7.7, 18.7 hørtes den kaldende, herefter ingen, af rastende **Bynkefugle** sås ; 15.8 1, 25.8 6, 27.8 6 og 30.8 1, **Sjagger** var alm. (med unger fra juni) hele perioden, derimod sås **Sangdrossel** ikke i juni, herefter flg. sparsomme obs.; 2.7 2, 7.7 1, 25.8 få rst., 27.8 1. Af **sangere** hørtes (og sås) **Rørsanger** med op til 40 ind. primo juni ; dvs omkring 40 ynglepar skønnet, herefter alm. syng. hele perioden, dog færre fra ult. august, **Kærsanger** hørtes kun med 1 syng. hhv 19.6 og 1.7, **Gulbug** ; 1 syng. 24.6 kunne indicere 1 ynglepar !? (fåtalig ynglefugl), **Munk** hørtes alm. syng. hele perioden og kaldende fra ult. august, **Havesanger** ligeledes alm. syng. juni/juli, og fra august ; 15.8 og 25.8 kaldende, **Tornsanger** ligeledes alm. syng. juni/juli, og fra august hørt syngende 15.8 og kaldende 25.8 og 1 set 21.8, **Gærdesanger** derimod hørtes "kun" syngende juni ud, herefter ingen obs., **Løvsanger** alm. syngende juni - medio august, og der blev i juni skønnet 30 ynglepar, fra ult. august hørt kaldende, **Gransanger** ; alm. syngende juni, nogle syng. juli, kaldende i august, fra ult. august mange rst., fåtalig trækfugl er **Grå Fluesnapper** som sås med 1 rst. 25.8, **Broget Fluesnapper** har muligvis ynglet i have op til mosen, idet 1 hørtes syng. her 11.6 (fåtalig ynglefugl), igennem juni/juli var **Jernspurv** alm. ynglende, herefter ingen obs., **Engpiber** begyndte så småt træk ult. august ; 21.8 få, 25.8 få og 26.8 få (rst./trk.) og ligeledes **Skovpiber** ; 21.8 nogle rst./trk., og resten af ult. august mange rst./trk., **Hvid Vipstjert** sås i perioden blot 4.6 1, ingen i juli, - august ; 15.8 2 og 27.8 1 rst. og de 2 første trk., **Gul Vipstjert** noteredes med første sommerfund fra mosen den 10.6 1 rst., efterårstrækket startede 13.8 med et pænt træk - og august ud jævnt træk. **Stær** ; fra primo juni/medio juli mange rst. med unger, som forsvandt ult. juli hvor der blot gjordes flg. obs. ; 27.7 ca. 60 V og 31.7 ca. 75 til overnatning, ingen i august. **Gråspurv** og **Skovspurv** var alm. hele perioden ; **Gråspurv** dog mest ved bebyggelse op til mosen, **Skovspurv** mere alm. i moseområdet ; f.eks flokke på flere hundrede fra medio juli/august ud. Af **finker** sås **Kernebider** (som er en fåtalig sommergæst) hhv 24.6 1, 1.7 1, 14.7 2 ovfl., 31.7 1 ovfl., 15.8 1 og 27.8 1, **Grønirisk** var meget alm. i hele perioden, med unger fra juli mnd., **Stillits** sås 2.6 1, 6.7 2, 7.7 få, 18.7 2, 24.7 1, 26.7 1, 27.7 1, 13.8 2, 14.8 1, 25.8 2, 27.8 1 og 30.8 få.; arten er ang. set med unger i sensommeren, ynglepar i eller nær mosen. **Grønsisken** ankom ret tidligt (invasion) ; en flok på ca. 65 ind. den 25.8, få den 26.8 og 27.8 og ca. 10 ind. 30.8, lidt **Tornirisk** sås ovfl./trk. hhv 15.8 1, 25.8 2 og 27.8 6 trk., **Gråsisken** (som har ynglet med 3-4 par d.å.) hørtes syngende hele juni/primo juli, sås med unger fra 2.6 til og med 31.7, herefter ingen obs., **Dompap** ; flg. obs. i perioden foreligger ; 7.6 1, 11.6 hørt, 17.6 juv., 19.6 hørt - ingen fra juli, august ; 15.8 og 27.8 få, alm. i hele perioden (med unger i juli) var **Bogfinke** og første sommerfund af **Kvækerfinke** (tilfældig sommergæst) blev gjort 22.6 hvor 1 sang i Fedtmosen (forlænget træk ?). 1 trk. **Hortulan** (sjælden gæst) hørtes - og sås den 26.8. **Rørspurv** var alm. syng. gennem juni/juli og alm. gennem august.

September & oktober

Skarv noteredes to gange i perioden, nemlig 23.9 1 trk. S og 5.10 9 trk. SØ, **Fiskehejre** sås med 3 ind.

gennem september og 2-3 ind. gennem oktober, en sjælden gæst, nemlig **Rørdrum** sås fra fugletårnet i Smørmosen med 1 rst. den 23.9, **Knopsvane**-parret med deres 4 juv. sås gennem hele perioden, herudover trak 5 SV den 24.10, af trk. **gæs** blev det til ; **Grågås** ; 7.10 10 S samt en flok på omkring 100 + 4 SV den 15.10, 15.10 iagttoges ligeledes to flokke på hhv ca.70 og ca. 40 **Brantagæs**, formentlig **Bramgås** (sjælden trækgæst) trk. SV, 40-50 **Gråænder** lå i mosen gennem hele perioden, det blev kun til flg. obs. af **Troldand** ; 21.9 1 hun rst., 14.10 1 hun rst. og 15.10 1 par rst., **Hvinand** (fåtallig trækgæst) sås med 4 trk. den 7.10, flere flokke på omkring hundrede **Ederfugle** (ret sjælden trækgæst) trak SV den 15.10, af **rovfugle** sås de sidste **Hvepsevåger** 5.9 2 trk., 22.9 3 trk. og 1 sen (faktisk første oktober-obs.) trk. den 5.10, **Duehøg** (fåtallig gæst) sås med 1 hun jag. 21.9, **Spurvehøg** sås derimod almindeligt med ca. 5 rst. og nogle trk. gennem sept., en del trk. (f.eks max ca. 25 trk. 5.10 samt ca. 20 trk. 14.10) + omkring 5 rst. gennem hele oktober, **Musvåge** ; af rst. fugle sås 2-4 gennem sept./primo okt., fra medio oktober og måneden ud 2, trækket begyndte 5.10 med ca. 30 trk., 6.10 med ca. 40 trk., 7.10 med 7 trk., og gennem hele oktober nogle trk., men absolut største dage blev 14.10 med omkring 1500 trk. SV og 16.10 med 300+ trk., nogle **Fjeldvåger** (fåtallig trækgæst) blev "spottet" med 2 trk. hhv 14.10 og 15.10, ligeledes fåtallig trækgæst er 1 "brun" **Kærhøg** sp., formentlig **Blå Kærhøg** med 1 rst. 12.9, og (atter) en fåtallig trækgæst ; **Rørhøg** sås 5.9 1 rst. og 1 juv. trk. 5.10 - (sen), **Fiskeørn** (fåtallig trækgæst) ; 1 trk. hhv 27.8 og 12.9, sjælden gæst er 1 juv. han **Vandrefalk** trk. 22.9, og fåtallig trækgæst er 1 **Dværgfalk** rastende 11.10, **Tårnfalk** derimod var fortsat alm. med hele familien gennem hele perioden, **Fasan** noteredes blot 14.10 1 han og 24.10 1 hørt, 1 **Trane** (fåtallig trækgæst) fløj N den 7.10, **Vandrikse** hørt blot med een fugl hhv 22.9 og 5.10, derimod var både **Rørhøne** og **Blishøne** ganske almindelige i perioden, en flok på omkring 80 ovfl. **Hjejler** (fåtallig trækgæst) noteredes 17.10, **Stormmåge**, **Sølvmåge**, og **Hættemåge** var alle alm. i hele perioden, en fåtallig trækgæst, nemlig **Huldue** sås med 1 trk. den 6.10, alm. var dog **Ringdue** med (fortsat) jævne SV-flyvende flokke gennem hele perioden, øgende til større flokke direkte trk. SV gennem oktober, dvs. flokstørrelser på nogle hundrede - desuden en hel del rst. gennem perioden, **Tyrkerdue** blev set som følger ; 11.9 1, 12.9 1 og 14.10 1, de sidste **Mursejlere** blev set til og med primo september, 1 **Sortspætte** (sjælden gæst) rastede i mosen den 26.9, derimod var **Stor Flagspætte** alm. med 2-3 ind. gennem hele perioden, **Hedelærke** (fåtallig trækgæst) iagttoges med 2 trk. den 5.10, mens **Sanglærke** begyndte trækket med 1 trk. 22.9, og herefter, gennem første halvdel af oktober var ganske alm. trækkende (f.eks ca. 100 trk. 5.10), men ikke nærmere optalt, **Landsvale** ; alm. rst.- og trk. gennem hele september, sidste notat blev 1.10 1 (ret sent, og første oktober-obs for mosen), ligeledes alm. gennem første halvdel af september var **Bysvale**, med sidste obs. 21.9 få og 22.9 1, gennem hele perioden holdt omkring tusind **kragefugle** til i området, flest **Alliker**, men også mange **Gråkrager** og **Råger** (som vanligt også få "vingebåndskrager" - samt 1 rst. **Sortkrage** 12.9), ganske alm. var ligeledes **Husskade**, - **Nøddekrige** (sjælden gæst) sås med 1 trk.S hhv 26.9 og 5.10, **Skovskade** sås med 5-10 ind. gennem første halvdel af sept., men fra 15.9 influx med ca. 35 rst./trk. fugle, herefter - dagligt - til og med medio oktober omkring 50 rst./trk. (invasion), fra ult. oktober mere normale tal ; ca. 10-15 rst., alm. var (naturligvis) både **Musvit** og **Blåmejse**, samt **Sumpmejse**, sidstnævnte dog "kun" med 5-8 ind. gennem hele perioden, **Halemejse** sås ligeledes almindeligt med 10-15 ind. gennem sept., men blot få medio okt. (sandsynligvis blot overset), **Spætmejse** (fåtallig/sjælden gæst) blev noteret på flg. dage ; 21.9 2 rst., 22.9 1 rst., 26.9 1 rst. samt 15.10 1 rst., **Træløber** var regelmæssig med 1-2 fugle gennem september og 1 fugl gennem oktober, karakterfugle var **Gærdesmutte** og **Rødhals** ; begge arter syngende gennem efteråret, **Rødstjert** (fåtallig trækgæst) noteredes 11.9 1 hun rst. og 21.9 2 rst., alle obs. af **Bynkefugl** nævnes ; 6.9 3 rst., 11.9 4 rst., 12.9 8 rst., 15.9 4 rst., 19.9 1 rst. og 6.10 2 rst.,

derimod blev **Stenpikker** blot set een gang dette efterår, nemlig 1 rst. 5.10 (sen fugl), **Solsort** var - som altid - ganske alm., **Sjagger** ligeledes alm. gennem hele perioden, med influx fra medio/ult.sept ; flere hundrede og mange hundrede gennem oktober, trækkende som rastende, **Vindrossel** ankom 21.9 1 og 23.9 1, - men først fra 7.10 influx med mange hundrede - dette billede oktober ud, **Sangdrossel** ; fra 19.9 - ult.sept. dgl. omkring 20 rst., primo oktober op til 50+ rst./trk. dgl. - "nogle" medio okt., og sidste 27.10 1 rst., af **sangere** sås **Rørsanger** ret alm. gennem første halvdel af sept., sidste notat 19.9 få, **Munk** noteredes hhv 12.9 1 hørt, 19.9 1, 21.9 3 rst. (subsang) og 22.9 1 (subsang), de sidste **Tornsangere** noteredes 6.9 2 rst. og 12.9 1 hørt, derimod var **Løvsanger** alm. rst. gennem hele sept., og sidste notat gjordes primo okt., ligeledes alm. rst. gennem sept./med.okt. var **Gransanger** ; og sidste notat for perioden gjordes 20.10 få, - gennem september (fra 11.9) dgl. få - 5-8 ind. af **Fuglekonge**, stigende til ca. 25 rst. gennem hele oktober, **Grå Fluesnapper** (fåtallig trækgæst) sås med de sidste fugle hhv 5.9 2 rst. og 11.9 1 rst., **Jernspurv** sås med "nogle" rst./trk. i perioden medio sept./primo okt., herefter få medio okt., **Engpiber** sås med få ind. primo/medio sept., fra ult.sept./primo okt. mange rst./trk. ; f.eks flere hundrede 23.9, 1000+ 5.10, - 6.10 og 7.10 mange hundrede, fra medio okt. "nogle" rst./trk. - og få trk. ult.okt., **Skovpiber** ; "nogle" rst./trk. gennem første halvdel af sept., herefter få ult. sept., og sidste 5.10 1 trk., **Hvid Vipstjert** sås fåtalligt, 1-8 ind., gennem hele september, og sidste obs. blev 5.10 1 trk. og 6.10 1, **Gul Vipstjert** var alm. med "nogle" rst./trk. gennem hele sept., og sidste obs. blev 6.10 få, **Silkehale** ; flere hørt 28.10 (tidligt), fra 19.9/- sept. og oktober ud sås regelmæssigt mellem 10 og 25 rst. **Stære** ; desuden enkelte trk. primo okt., både **Gråspurv**, og specielt **Skovspurv** var alm. i perioden, sidstnævnte i flokke på flere hundrede gennem sept./okt., alle obs. af **Kernebider** nævnes ; 11.9 1, 15.9 1, 19.9 3, 21.9 1 og 5.10 1, ganske alm. i hele perioden var **Grønirisk**, og **Stillits** sås regelmæssigt gennem september med 5-8 ind., og almindeligt gennem oktober med max 45 ind. primo, 15 medio og 10 ultimo, **Grønsiken** (som jo ankom tidligt i år, jvf. sidste periode - invasionsart) sås almindeligt gennem hele perioden med max 20-40 ind. gennem september, max 50 ind. primo oktober, herefter alm./flere småflokke resten af oktober (herudover nogle trk. fugle i perioden medio sept./primo okt.), eneste obs. af **Bjergirisk** (fåtallig trækgæst) gjordes 27.10 med 1 ovfl., **Gråsisken** - derimod - sås, igen almindeligt fra 7.9 - september og oktober ud, med få ind., 1-8 stk. i sept. og ligeledes få ind., max 10, gennem oktober, herudover 13 direkte trk. 7.10, en tilfældig gæst er **Gulirisk** (ny art for mosen, art nr. 184 ialt) idet en sen fugl sås og hørtes flyvende Ø den 24.10, **Dompap** var alm. med ca. 5 ind. gennem september og 5-10 ind. gennem oktober (herudover få direkte trk. primo okt.), **Lille Korsnæb** (fåtallig trækgæst) sås hhv 6.10 1 trk. og 15.10 5 ovfl., **Bogfinke** var alm. rst. gennem hele perioden, lidt træk noteredes fra 11.9, men først fra ult. sept. større træktal ; f.eks 23.9 flere tusinde trk., og flg. dage med flere tusinde trk. var 5.10, 6.10 og 7.10, herefter "nogle" trk. oktober ud, iblandt dem hørtes også en del **Kvækerfinker** trk. (i perioden 23.9 - medio okt. (omkring 15 - 20 % "kvækere")), udover flere rst. gennem hele oktober, **Gulspurv** ; alle obs. nævnes ; (igen) 6.10 1 rst., 14.10 2 rst. og 15.10 3 rst., **Rørspurv** ; faldt i antal, til kun få ind. til og med medio september, herefter - medio/ult. sept. flere rst., og gennem oktober mange rst./trk. første halvdel, herefter et fald til "nogle" ult. oktober.

November & december

Lille Lappedykker noteredes hhv 19.11 2 rst. og 2.12 1 rst. (faktisk første efterårs/vinterobs. gennem

årene!), **Skarv** sås ovfl. 1.12 2 SV, 13.12 5 SV og 22.12 1 SØ, der sås 1-2 rst. **Fiskehejrer** gennem nov.- og 2-3 ind. gennem december, ult. oktober sås 2 trk. **Sangsvaner** (fåtallig trækgæst), til og med medio november sås **Knopsvane**-parret med deres 4 juv., herefter blev 1 ad. + 1 juv. set kortvarigt medio december, af overflyvende/trk. fugle sås 13.12 7 SV og 22.12 13 N + 2 SV, en flok på 16 SV-trk. **Canadagæs** (uregelmæssig trækgæst) passerede mosen 7.12, **Gråand** ; alm. med 35-40 ind. gennem nov., alm. med ca. 30 ind. gennem første halvdel af december, herefter, ult. december, sås op til 85 ind. i våge ved "Svanesøen"- da mosen i denne periode var islagt, **Troldand** forekom således ; november ; 9.11 1 , 11.11 3, 30.11 2, december ; 2 primo og 1 kortvarigt medio (alle rst.), **Duehøg** (fåtallig vintergæst) indfandt sig i mosen med 1 hun rst. 2.11, 1 rst. 7.11, 1 han rst. 11.11, 1 2K/imm. hhv 30.11, 1.12, 21.12 og 22.12 (sås rst./jag.), **Spurvehøg** sås med 2-4 ind. gennem nov./december, **Musvåge** sås fast med 3 rst. gennem nov. og 4-5 rst. gennem december, 1-2 **Tårnfalke** ligeledes fast gennem hele perioden, **Vandrikse** ; 2 fugle hørtes 11.11 (sjælden vintergæst), **Grønbenet Rørhøne** ; blot få ind. til og med medio nov. (sidste obs. 11.11), derimod var **Blishøne** ganske alm. gennem november/medio november, herefter (ult.december) forsvandt de pga frost/is, alm. i perioden var **Stormmåge**, **Sølvmåge** (dog i mindre tal) og **Hættemåge**, af rst. **Ringduer** sås omkring 80 ind. gennem november, ca. 50 ind. gennem første halvdel af dec./færre, ca. 30 ind. fra ult. dec. (kulde), en enkelt **Tyrkerdue**-obs., nemlig 13.12 2 blev det til, **Natugle** (som jo ses og høres sjældent) blev ang. set een gang i skumring i efteråret - og 1 hørtes ved nattetide 16.11, gennem hele perioden sås 2-4 **Store Flagspætter**, **Sanglærke** ; flg. obs. gjordes ; 3.11 ca. 10 trk., 9.11 og 11.11 få trk., 1 **Ravn** (sjælden gæst) sås ovfl. den 25.12, omkring 1000 **kragefugle** rastede gennem hele perioden, flest **Alliker**, men også en del **Gråkrager** og **Råger** (iøvrigt, som vanligt, få "vingebåndskrager" i hele perioden), iøvrigt ganske alm. var **Husskade**, **Skovskade** sås alm. med ca. 15 ind. gennem nov. og ca. 10 ind. gennem dec., **Musvit** og **Blåmejse** forekom, som vanligt, ganske almindeligt, **Sumpmejse** ligeledes alm., dog blot med ca. 8 ind. gennem nov. og ca. 5 ind. gennem dec., **Halemejse** ; alm., men fåtallig ; 6-8 ind. gennem nov. og 10-15 ind. gennem dec., den, for mosen, fåtallige/sjældne **Spætmejse** blev noteret med 1 ind. rst. den 3.11, regelmæssig var **Træløber** med 1-2 gennem nov. og 2-4 ind. gennem december, karakterfugle var **Gærdesmutte** og **Rødhals** ; begge arter syng. gennem hele perioden, **Solsort** forekom, som altid, ganske almindeligt, flere hundrede **Sjaggere** rst. gennem hele perioden, færre **Vindrosler** ; dog 100+ primo/medio november, få ult.nov., - og ganske få til og med medio december, den sidste **Gransanger** noteredes 3.11 1, **Fuglekonge** forekom således ; november ; ca. 20 rst. primo, 10-15 rst. med., ca. 10 rst. ult, gennem hele december 10+ rst., **Silkehale** blev noteret 3.11 flere hørt, 8.11 ca. 20 rst., 9.11 ca. 20 rst., 14.11 ca. 20 rst. og 19.11 hørt - ingen december-obs., **Stær** ; blot to obs. fra perioden ; 17.11 5 rst. og 19.11 en flok på ca. 45 rst., **Gråspurv** og **Skovspurv** forekom begge alm. ved bebyggelse i området, alle obs. af **Kernebidere** nævnes ; 11.11 3, 15.11 1, 1.12 1, 13.12 4, 22.12 1 og 28.12 1, **Grønirisk** ; alm. hele perioden, **Stillits** ; regelmæssig, men fåtallig, 3-8 ind., gennem hele november og december (dog een enkelt flok på 22 ind. noteret medio december), **Grønsisken** ; gennem hele nov./dec. småflokke rst., **Gråsisken** ; gennem hele nov./dec. regelmæssig med få fugle/ca.5 rst., **Dompap** ; gennem nov. 15-20 rst. og gennem december 20-25 rst., **Bogfinke** ; "nogle" rst. gennem hele perioden, **Kvækerfinke** ; sås kun til og med medio nov. med omkring 10 rst., regelmæssig gennem nov./dec. forekom **Gulspurv**, dog ikke større tal, normalt omkring 5-7 ind., dog ca. 15 rst. 22.12, alle obs. af **Rørspurv** nævnes ; 3.11 ca. 10 rst., 9.11 1 rst., 19.11 1 rst., - herefter ingen til flg. vinter-fund blev gjort (sjælden vintergæst) ; 1.12 1 rst., 13.12 2-3 rst. og 22.12 1 rst..

**Frank Desting
Naturgruppen
2730 Herlev**

Floraliste

Hermed følger en floraliste for mosen, baseret på S.H.Stensig's og undertegnedes floristiske obs. fra 1978 - 1980, samt lidt egne obs. fra 1993. Listen følger Illustreret Flora ved Baltzer/Lange, 6 udg. 1982.

Herefter følger en komplet oversigt over de i Smør - og Fedtmosen truffne arter til og med 1999, denne liste følger Fitter & Blamey ; Nordeuropas vilde planter, Dansk udg. ved Lange 1974.

Floraliste baseret på tidligere fund af S.H.Stensig og undertegnede

Ager-Padderok 1978-1980, 1993, Dynd-Padderok 1978-1980, 1993, Skov-Fyr 1993, Rød-Gran 1993, Grenet Pindsvineknop 1993, Spæd Pindsvineknop 1993, Bredbladet Dunhammer 1993, Dansk Ingefær/Plettet Ingefær 1978-1980, 1993, Liden Andemad 1978-1980, 1993, Stor Andemad 1978-1980, 1993, Svømmende Vandaks 1978-1980, Vejbred-Skeblad 1978-1980, Tagrør 1993, Rørgræs 1993, Eng-Rottehale 1978-1980, 1993, Eng-Rævehale 1993, Alm. Hundegræs 1993, Katteskæg 1978-1980, 1993, Alm. Star 1978-1980, Blære-Star 1978-1980, Mark-Frytle 1978-1980, Mangeblomstret Frytle 1978-1980, Rams-Løg 1978-1980, 1993, Liljekonval 1978-1980, 1993, Gul Iris 1993, Æg-Fliglæbe 1978-1980, 1993, Pil sp. 1993, Bævreasp 1993, Vorte-Birk 1993, Dun-Birk 1993, Rød-El 1993, Bøg 1993, Stor Nælde 1993, Liden Nælde 1993, Butbladet Skræppe 1993, Nøgleblomstret Skræppe 1978-1980, Alm. Syre 1978-1980, 1993, Vand-Pileurt 1993, Fersken-Pileurt 1993, Bleg Pileurt 1978-1980, 1993, Stor Fladstjerne 1978-1980, 1993, Kløvkrone 1993, Trævlekroner 1978-1980, Filtet Hønsetarm 1978-1980, 1993, Aften-Pragtstjerne 1978-1980, 1993, Blæresmelde 1978-1980, 1993, Bakke-Nellike 1978-1980, 1993, Sæbeurt 1993, Gul Åkande 1993, Hvid Åkande 1993, Tornet Hornblad 1993, Eng-Kabbeleje 1978-1980, 1993, Akeleje 1978-1980, 1993, Ægte Stormhat 1978-1980, Langbladet Ranunkel 1978-1980, Nyrebladet Ranunkel 1978-1980, 1993, Vorterod 1993, Blå Anemone 1978-1980, Hvid Anemone 1978-1980, 1993, Gul Anemone 1978-1980, Blegblå Anemone 1978-1980, Korn-Valmue 1993, Læge-Jordrøg 1978-1980, Alm. Pengeurt 1978-1980, Hyrdetaske 1978-1980, 1993, Takkeklap 1978-1980, Løgekarse 1993, Ager-Sennep 1993, Alm. Vinterkarse 1978-1980, 1993, Vand-Peberrod 1978-1980, 1993, Judaspenge 1978-1980, Vej-Guld-karse 1978-1980, 1993, Gåsemad 1978-1980, Stivhåret Kalkkarse 1978-1980, Tårnurt 1978-1980, Vellugtende Aftenstjerne 1978-1980, Gul Reseda 1978-1980, 1993, Saxifraga Geum (Hirsuta x umbrosa) 1979, 1980, 1985, Alm. Hvidtjørn 1978-1980, 1993, Æble 1993, Alm. Røn 1993, Hindbær 1978-1980, 1993, Alm. Jordbær/Skov-Jordbær 1978-1980, 1993, Kragefod 1978-1980, Gåse-Potentil 1978-1980, 1993, Krybende Potentil 1978-1980, Feber-Nellikerod 1978-1980, 1993, Eng-Nellikerod 1978-1980, 1993, Alm. Mjødurt 1978-1980, 1993,

Alm. Agermåne 1993, Alm. Løvefod 1978-1980, Bibernelle 1978-1980, 1993, Hunde-Rose 1993, Lucerne 1978-1980, 1993, Humle-Sneglebælg 1993, Mark-Krageklo 1978-1980, 1993, Hvid Stenkløver 1978-1980, Hvid-Kløver 1993, Rød-Kløver 1993, Alm. Kællingetand 1978-1980, 1993, Muse-Vikke 1978-1980, 1993, Smalbladet Vikke 1993, Gul Fladbælg 1993, Vår-Fladbælg 1978-1980, Skovsyre 1978-1980, Blodrød Storckenæb 1978-1980, Stinkende Storckenæb 1978-1980, Liden Storckenæb 1978-1980, Blød Storckenæb 1978-1980, 1993, Østrigsk Hør 1978-1980, Alm. Bingelurt 1978-1980, Skærm-Vortemælk 1978-1980, Spids-Løn 1978-1980, Alm. Katost 1978-1980, 1993, Kantet Perikon 1993, Prikbladet Perikon 1978-1980, 1993, Ager-Stedmoderblomst 1978-1980, 1993, Forvildet Stedmoderblomst 1978-1980, Marts-Viol 1993, Skov-Viol 1978-1980, Hunde-Viol 1978-1980, Kattehale 1978-1980, 1993, Gederams 1978-1980, 1993, Lådden Dueurt 1993, Glat Dueurt 1978-1980, 1993, Dunet Steffensurt 1978-1980, Toårig Natlys 1978-1980, Vild Kørvel 1978-1980, 1993, Spansk Kørvel/Sødsærm 1978-1980, Skvalderkål 1978-1980, 1999, Bredbladet Mærke 1978-1980, Pastinak 1978-1980, 1993, Alm. Bjørneklo 1993, Kæmpe-Bjørneklo 1993, Vild Gulerod 1978-1980, Hedelyng 1993, Fladkravet Kodriver 1978-1980, Hulkravet Kodriver 1978-1980, Alm. Fredløs 1993, Ager-Snerle 1993, Gærde-Snerle 1993, Læge-Kulsukker 1978-1980, Oksetunge 1978-1980, Femtunge 1978-1980, 1993, Eng-Forglemmigej 1978-1980, Sump-Forglemmigej 1978-1980, 1993, Skov-Forglemmigej 1978-1980, Mark-Forglemmigej 1993, Slangehoved 1978-1980, 1993, Krybende Læbeløs 1978-1980, 1993, Korsknapp 1978-1980, Alm. Brunelle 1993, Hampagtig Hanekro 1993, Alm. Hanekro 1993, Sand-Hanekro 1978-1980, Guldnælde 1978-1980, Døvnælde 1993, Rød Tvetand 1993, Liden Tvetand 1993, Kær-Galtetand 1978-1980, 1993, Ager-Mynte 1993, Bittersød Natskygge 1978-1980, 1993, Alm. Torskemund 1993, Mørk Kongelys 1978-1980, Filtet Kongelys 1978-1980, Aks-Ærenpris 1978-1980, 1993, Tveskægget Ærenpris 1984, Tykbladdet Ærenpris 1978-1980, Liden Skjaller 1978-1980, Stor Skjaller 1978-1980, Alm. Blærerod 1978-1980, Glat Vejbred 1993, Burre-Snerre 1993, Skovmærke 1978-1980, 1993, Gul Snerre 1978-1980, 1993, Hvid Snerre 1978-1980, 1993, Alm. Hyld 1993, Hylde-Baldrian 1978-1980, Gærde-Kartebolle 1993, Pindsvin-Kartebolle 1978-1980, Nældebladet Klokke 1978-1980, Bredbladet Klokke 1978-1980, 1993, Blå-Klokke 1978-1980, 1993, Gyldenris (forv.art) 1993, Tusindfryd 1978-1980, 1993, Pile-Alant 1978-1980, Farve-Gåseurt 1978-1980, 1993, Ager-Gåseurt 1978-1980, 1993, Alm. Røllike 1978-1980, 1993, Nyse-Røllike 1993, Lugtløs Kamille 1993, Skive-Kamille 1993, Matrem 1978-1980, Rejnfan 1993, Hvid Okseøje 1993, Gul Okseøje 1993, Grå-Bynke 1993, Følfod 1993, Eng-Brandbæger 1978-1980, Bakketidsel 1978-1980, Filtet Burre 1993, Liden Burre 1993, Kær-Tidsel 1978-1980, 1993, Kål-Tidsel 1993, Ager-Tidsel 1978-1980, 1993, Alm. Knopurt 1978-1980, Kornblomst 1978-1980, 1993, Stor Knopurt 1993, Haremad 1978-1980, 1993, Eng-Gedeskæg 1978-1980, 1993, Ager-Svinemælk 1978-1980, Skov-Salat 1978-1980, Mælkebøtte 1978-1980, 1993.

Div. andre noterede arter ; Hestekastanie 1978-1980, Vintergæk 1993, Eranthis 1993, Guldregn 1993, Kærminde 1993, Påskelilje 1993, Tobladet Skilla 1993, Klokke-Skilla 1993, Japansk Boghvede 1978-1980, Kokartebloomst 1978-1980, Spiraea alba 1978-1980, Liden Singrøn 1978-1980, 1993, Kæmpe-Mjødurt 1979, Jomfru I Det Grønne 1978-1980, Hjulkrone 1978-1980, Stor Tusindstråle 1978-1980, 1993.

Komplet floraliste over trufne arter i Smør - og Fedtmosen - til og med 1999, med angivelse af forekomst, voksested etc., i alt op mod 390 arter. Vedr. forekomst af de fra litteraturen hentede

arter henvises til denne, jvf. litt.listen i Smør - og Fedtmosen - en status - Frank Desting 1998/2000.Obs. ; alle noterede arter for 1999 er markeret med understregning - og, hvis intet andet er nævnt er forekomsten baseret for 1999.

Listen følger Nordeuropas vilde planter ved Fitter & Blamey, Dansk udg. ved Lange 1974 :

Granfamilien

Rød-Gran ; hist og her.

Skov-Fyr ; hist og her.

Pilefamilien

Div. pil ; alm.

Femhannet Pil ; jvf. litt.

Selje-Pil ; jvf. litt.

Grå-Pil ; jvf. litt.

Storbladet Pil ; jvf. litt.

Hængepil ; jvf. litt.

Poppel sp. ; hist og her.

Sølv-Poppel ; jvf. litt.

Bævreasp ; hist og her.

Birkefamilien

Vorte-Birk ; alm.

Dun-Birk ; hist og her, noteret 1993.

Rød-El ; hist og her.

Hasselfamilien

Avnbøg ; jvf. litt.

Hassel ; hist og her.

Bøgefamilien

Bøg ; hist og her.

Alm. Eg ; hist og her.

Elmfamilien

Skov-Elm ; hist og her.

Lønfamilien

Ahorn ; hist og her.
Spids-Løn ; jvf. litt.

Hestekastaniefamilien

Hestekastanie ; hist og her.

Lindfamilien

Lind sp. ; hist og her.

Ligusterfamilien

Ask ; hist og her.
Syren ; jvf. litt.

Nældefamilien

Stor Nælde ; alm.
Brænde-Nælde (Liden Nælde) ; alm.

Skedeknæfamilien

Vand-Pileurt ; ret alm.
Fersken-Pileurt ; ret alm.
Bleg Pileurt ; hist og her, noteret 1978-1993.
Vej-Pileurt ; alm.
Japansk-Boghvede ; fåtallig.
Alm. Syre ; alm.
Butbladet Skræppe ; alm.
Nøgle-Skræppe ; hist og her, noteret 1978-1980.
Vand-Skræppe ; hist og her.

Gåsefodfamilien

Stolhenriks-Gåsefod ; ny art for mosen, ret alm.

Nellikefamilien

Markarve ; ny art for mosen, ret alm.
Stor Fladstjerne ; mindre bestand, noteret i Smørmosen, 1978-1993.

Kær-Fladstjerne ; hist og her.

Fuglegræs ; alm.

Kløvkrone ; hist og her, noteret 1993.

Storblomstret Hønsetarm ; ny art for mosen, hist og her.

Filtet Hønsetarm ; bestand, årligt noteret på ruderat ved Tibbevungen og Værebrovej.

Blæresmelde ; alm.

Aften-Pragtstjerne ; hist og her.

Trævlekrone ; ret alm./hist og her.

Sæbeurt/Fyltdblomstret Sæbeurt ; fåtallig/hist og her.

Bakke-Nellike ; pæn bestand, årligt noteret på ruderat ved Tibbevungen og Værebrovej.

Studerer-Nellike ; ny art for mosen, fåtallig i Smørmosen.

Ranunkelfamilien

Jomfru I Det Grønne ; få eks., noteret 1978-1980, - på ruderat ved Værebrovej.

Erantis ; alm.

Eng-Kabbeleje ; hist og her, noteret 1978-1993.

Lav Ranunkel ; alm.

Langbladet Ranunkel ; ret alm.

Vorterod ; alm.

Nyrebladet Ranunkel ; hist og her, noteret 1978-1993.

Tigger-Ranunkel ; hist og her.

Druemunke ; jvf. litt.

Akeleje ; pæn bestand, årligt noteret i Smørmosen.

Ægte Stormhat ; fåtallig, noteret 1978-1980, - ved Kagsåengen syd for mosen.

Hvid Anemone ; alm.

Blegblå Anemone - (var. apennina) ; mindre bestand, noteret 1978-1980, - kun i Smørmosen.

Gul Anemone ; mindre bestand, i Smørmosen.

Blå Anemone ; mindre bestand, noteret 1978-1980, - kun i Smørmosen.

Åkandefamilien

Gul Åkande ; ret alm.

Hvid Nøkkerose ; ret alm.

Berberisfamilien

Alm. Mahonie ; jvf. litt.

Jordrøgfamilien

Læge-Jordrøg ; alm.

Valmuefamilien

Korn-Valmue ; alm.

Gærde-Valmue ; ny art for mosen, hist og her.

Korsblomstfamilien

Takkeklap ; få eks., noteret 1978-1980, - umiddelbart op til området.

Alm. Vinterkarse ; ret alm.

Vandpeberrod ; hist og her.

Vej-Guldkarse ; noteret hist og her, 1978-1993.

Ager-Kål ; ny art for mosen, ret alm.

Raps ; hist og her.

Ager-Sennep ; alm.

Tandrod ; noteret medio 90'erne via DBF.

Løgekarse ; alm.

Vellugtende Aftenstjerne ; hist og her.

Måneskulpe ; jvf. litt.

Judaspenge ; hist og her.

Gåsemad ; hist og her, noteret 1978-1980.

Stivhåret Kalkkarse ; fåtallig, noteret 1978-1980, - ved Kagsåengen syd for mosen.

Tårnurt ; fåtallig, i Smørmosen.

Hyrdetaske ; alm.

Alm. Pengeurt ; hist og her.

Resedafamilien

Gul Reseda ; årligt pæn bestand, i Fedtmosen.

Soldugfamilien

Rundbladet Soldug ; jvf. litt.

Stenurtfamilien

Sankt-Hansurt ; hist og her.

Rosenfamilien

Alm. Mjødurt ; alm.

Kæmpe-Mjødurt ; fåtallig, noteret i Smørmosen, 1979.

Alm. Agermåne ; ret alm., - i Fedtmosen.

Bibernelle ; pæn bestand, årligt noteret på ruderat ved Tibbevungen og Værebrovej.

Alm. Løvefod ; fåtallig, noteret i Smørmosen, 1978-1980.

Div. Rose-arter ; alm.

Hunde-Rose ; hist og her, noteret 1993.
Rynket Rose ; jvf. litt.
Gul Rose ; jvf. litt.
Korbær ; jvf. litt.
Hindbær ; alm.
Alm. Jordbær/Skov-Jordbær ; noteret hist og her, 1978-1993.
Skov-Jordbær ; hist og her.
Have-Jordbær ; jvf. litt.
Kragefod ; hist og her.
Eng-Nellikerod ; alm.
Feber-Nellikerod ; alm.
Krybende Potentil ; ret alm.
Gåsepotentil ; alm.
Æble sp. ; hist og her.
Røn sp. ; hist og her.
Alm. Røn ; hist og her, noteret 1993.
Selje-Røn ; jvf. litt.
Bornholmsk Røn ; jvf. litt.
Alm. Hvidtjørn ; hist og her.
Mirabel ; hist og her.
Blomme ; ny art for mosen, fåtallig/hist og her.
Fugle-Kirsebær ; hist og her.

Ærteblomstfamilien

Guldregn ; hist og her.
Mangebladet Lupin ; ny art for mosen, pæn bestand, - ved "Lillemosegård".
Muse-Vikke ; alm.
Smalbladet Vikke ; hist og her.
Tofrøet Vikke ; ny art for mosen, pæn bestand, - på kultureng ved Klausdal.
Gul Fladbælg ; hist og her.
Vår-Fladbælg ; fåtallig, noteret i Smørmosen, 1978-1980.
Mark-Krageklo ; hist og her, noteret 1978-1993.
Mark-Stenkløver ; ny art for mosen, ret alm.
Hvid Stenkløver ; ret alm.
Lucerne ; alm.
Alm. Kællingetand ; alm., - i Fedtmosen, - specielt ved Tibbevungen.
Humle-Sneglebælg ; alm.
Udstrakt Kløver ; ny art for mosen, mindre bestand, - på kultureng ved Klausdal.
Rød-Kløver ; alm.
Hvid-Kløver ; alm.
Alsike-Kløver ; ny art for mosen, hist og her.

Surkløverfamilien

Skovsyre ; mindre bestand, - noteret i Smørmosen, 1978-1980.

Hørfamilien

Vild Hør ; jvf. litt.

Østrigsk Hør ; mindre bestand, - noteret på ruderat ved Tibbevangen og Værebrovej, 1978-1980, ikke genfundet i 90'erne.

Storkenæbfamilien

Eng-Storkenæb ; ny art for mosen, ret alm., specielt i Fedtmosen.

Blodrød Storkenæb ; mindre bestand, - noteret i Smørmosen, 1978-1980.

Stinkende Storkenæb ; hist og her.

Geraniaceae purpureum ; ny art for mosen, hist og her.

Blød Storkenæb ; hist og her, noteret 1978-1993.

Liden Storkenæb ; hist og her.

Kløftet Storkenæb ; ny art for mosen, hist og her.

Vortemælkfamilien

Skærm-Vortemælk ; få eks., - noteret ved Tibbevangen, 1978-1980.

Alm. Bingelurt ; mindre bestand, - noteret i Smørmosen, 1978-1980.

Balsaminfamilien

Småblomstret Balsamin ; hist og her.

Katostfamilien

Moskus-Katost ; hist og her.

Alm. Katost ; hist og her, noteret 1978-1993.

Perikonfamilien

Prikbladet Perikon ; alm.

Kantet Perikon ; alm.

Vinget Perikon ; jvf. litt.

Violfamilien

Marts-Viol ; alm.

Skov-Viol ; noteret hist og her, - i Smørmosen, 1978-1980.

Hunde-Viol ; noteret hist og her, - i Smørmosen, 1978-1980.
Ager-Stedmoderblomst ; noteret hist og her, 1978-1993.
Alm. Stedmoderblomst ; jvf. litt.
Forvildet Stedmoderblomst ; fåtallig, - noteret syd for mosen, - ved Kagsåengen, 1978-1980.

Natlysfamilien

Dunet Steffensurt ; mindre bestand, - noteret i Smørmosen, 1978-1980.
Toårig Natlys ; fåtallig, - i Smørmosen.
Gederams ; alm.
Lådden Dueurt ; alm.
Glat Dueurt ; ret alm.
Kær-Dueurt ; ny art for mosen, hist og her.

Kattehalefamilien

Kattehale ; alm.

Kornelfamilien

Rød Kornel ; jvf. litt.

Vedbendfamilien

Vedbend ; hist og her, - i Smørmosen.

Skærmbloomstfamilien

Vild Kørvel ; alm.
Spansk Kørvel/Sødskaerm ; fåtallig, - noteret i Smørmosen, 1978-1980.
Vild Gulerod ; hist og her.
Skvalderkål ; alm.
Alm. Bjørneklo ; alm.
Kæmpe-Bjørneklo ; hist og her.
Angelik ; jvf. litt.
Skov-Angelik ; jvf.litt.
Skarntyde ; jvf. litt.
Bredbladet Mærke ; noteret hist og her, 1978-1980.
Kær-Svovlrød ; jvf. litt.
Pastinak ; alm.

Lyngfamilien

Hedelyng ; fåtallig, - noteret i Smørmosen, 1993.

Blåbær ; jvf. litt.
Mosebølle ; jvf. litt.
Tranebær ; jvf. litt.

Kodriverfamilien

Fladkravet Kodriver ; noteret hist og her, 1978-1980.
Hulkravet Kodriver ; alm.
Alm. Fredløs ; ret alm.
Vandrøllike ; jvf. litt.

Bukkebladfamilien

Bukkeblad ; jvf. litt.

Singrønfamilien

Liden Singrøn ; årligt pæn bestand, - i Smørmosen.
Vinca ; jvf. litt.

Snerlefamilien

Gærde-Snerle ; alm.
Ager-Snerle ; alm.

Krapfamilien

Skovmærke ; mindre bestand, noteret i Smørmosen, 1978-1993.
Hvid Snerre ; alm.
Kær-Snerre ; hist og her.
Gul Snerre ; noteret hist og her, 1978-1993.
Burre-Snerre ; alm.

Rubladfamilien

Læge-Kulsukker ; pæn bestand, - noteret årligt i Smørmosen.
Foder-Kulsukker ; ny art for mosen, pæn bestand, - i Smørmosen.
Kærminde ; fåtallig, - noteret i Fedtmosen, 1993.
Skov-Forglemmigej ; noteret hist og her, 1978-1980.
Mark-Forglemmigej ; alm.
Eng-Forglemmigej ; alm.
Sump-Forglemmigej ; hist og her.
Pigfrø ; ny art for mosen, få eks. noteret, - i Fedtmosen.

Slangehoved ; alm.

Femtunge ; noteret hist og her, 1978-1993.

Hjulkrone ; få eks., - noteret på ruderat ved Værebrovej, 1978-1980.

Oksetunge ; få eks., - noteret ved Kagsåengen, - syd for mosen, 1978-1980.

Læbeblomstfamilien

Krybende Læbeløs ; årligt pæn bestand, - i Smørmosen.

Alm. Skjolddrager ; ret alm.

Alm. Brunelle ; alm.

Korsknap ; alm.

Døvnælde ; ret alm.

Rød Tvetand ; alm.

Liden Tvetand ; ret alm.

Alm. Hanekro ; hist og her.

Sand-Hanekro ; fåtallig, - noteret 1978-1980.

Hampagtig Hanekro ; alm.

Guldnælde ; fåtallig, - noteret i Smørmosen, 1978-1980.

Kær-Galtetand ; hist og her, - i Smørmosen.

Ager-Mynte ; noteret hist og her, 1993.

Sværtevæld ; hist og her, - i Smørmosen.

Natskyggefamilien

Bittersød Natskygge ; ret alm./hist og her.

Maskeblomstfamilien

Filtet Kongelys ; fåtallig.

Storblomstret Kongelys/Uldbladet Kongelys ; ny art for mosen, fåtallig.

Mørk Kongelys ; fåtallig.

Klase-Kongelys ; ny art for mosen, fåtallig.

Knoldet Brunrod ; Jvf. litt.

Alm. Torskemund ; alm.

Rødtop ; ny art for mosen, pæn bestand, - på ruderat ved Tibbevangen.

Gul Bartsie ; ny art for mosen, fundet 27.7.99, - 86 ind. optalt 13.8.99, - på kultureng ved Klausdal/Smørmosen. (Årets fund på Sjælland iflg. URT 1/2000, DBF!).

Aks-Ærenpris ; pæn bestand årligt, - ved Tibbevangen.

Tveskægget Ærenpris ; alm.

Tykbladet Ærenpris ; fåtallig, noteret i Smørmosen, 1978-1980.

Læge-Øjentrøst ; jvf. litt.

Liden Skjaller ; alm.

Stor Skjaller ; hist og her, noteret 1978-1980.

Vejbredfamilien

Glat Vejbred ; alm.

Lancetbladet Vejbred ; ny art for mosen, alm.

Baldrianfamilien

Hylde-Baldrian ; ret alm.

Gedebladfamilien

Alm. Hylde ; hist og her.

Kartebollefamilien

Blåhat ; ny art for mosen, ret alm., - i Fedtmosen.

Djævelsbid ; jvf. litt.

Pindsvin-Kartebolle ; fåtallig, noteret ved Kagsåengen, - syd for mosen, 1978-1980.

Gærde-Kartebolle ; fåtallig, - i Fedtmosen.

Klokkefamilien

Blå-Klokke ; ret alm.

Nælde-Klokke ; hist og her.

Bredbladet Klokke ; hist og her.

Havepest ; ny art for mosen, pæn bestand i Smørmosen.

Kurvblomstfamilien

Hjortetrøst ; hist og her.

Alm. Gyldenris ; fåtallig/hist og her.

Sildig Gyldenris/(tidl. Gyldenris forv.) ; alm.

Bellis/Tusindfryd ; alm.

Lugtløs Kamille ; alm.

Skive-Kamille ; alm.

Ager-Gåseurt ; alm., - noteret ved Tibbevangen, 1978-1993.

Strand-Asters ; jvf.litt.

Pile-Alant ; fåtallig, - noteret i Smørmosen, 1978-1980.

Stor Tusindstråle ; årligt pæn bestand, - i Smørmosen.

Tusindstråle ; jvf. litt.

Farve-Gåseurt ; alm., - i Fedtmosen.

Solsikke sp. ; ny art for mosen, fåtallig.

Rød Hestehov ; pæn bestand, - i Smørmosen.

Alm. Røllike ; alm.

Røllike sp. (med stærkt røde kroner) ; noteret på ruderat ved Værebrovej, 1978-1980.

Nyse-Røllike ; hist og her/ret alm.

Grå-Bynke ; alm.

Fliget Brøndsel ; hist og her.

Nikkende Brøndsel ; ny art for mosen, hist og her.

Hvid Okseøje ; alm.

Matrem ; fåtallig, - noteret ved Kagsåengen, - syd for mosen, 1978-1980.

Rejnfan ; alm.

Gul Okseøje ; alm., - i Fedtmosen.

Følfod ; alm.

Eng-Brandbæger ; fåtallig, - noteret ved Kagsåengen, - syd for mosen, 1978-1980.

Stolt-Henriks Brandbæger ; ny art for mosen, ret alm.

Bakketidssel ; hist og her, - noteret 1978-1980.

Liden Burre ; alm.

Filtet Burre ; alm.

Kål-Tidssel ; ret alm.

Ager-Tidssel ; alm.

Horse-Tidssel ; alm.

Forskelligbladet Tidssel ; årligt en pæn bestand, - i Smørmosen.

Kruset Tidssel ; hist og her.

Kær-Tidssel ; hist og her.

Alm. Knopurt ; ret alm.

Stor Knopurt ; ret alm.

Bjerg-Knopurt ; ny art for mosen, hist og her.

Kornblomst ; hist og her.

Eng-Gedeskæg ; alm.

Cikorie ; ny art for mosen, hist og her.

Alm. Svinemælk ; alm.

Ager-Svinemælk ; alm.

Skovsalat ; pæn bestand, - i Smørmosen.

Haremad ; alm.

Alm. Mælkebøtte ; alm.

Alm. Kongepen ; ny art for mosen, alm.

Grøn Høgeskæg ; ny art for mosen, alm.

Kær-Høgeskæg ; ny art for mosen, hist og her.

Skebladfamilien

Vejbred-Skeblad ; hist og her, - i Smørmosen.

Frøbidfamilien

Frøbid ; hist og her, - i Smørmosen.

Krebseklo ; hist og her, - i Smørmosen.

Liljefamilien

Liljekonval ; årligt en pæn bestand, - i Smørmosen.

Alm. Guldstjerne ; jvf. litt.

Rams-Løg ; årligt en pæn bestand, - i Smørmosen.

Klokkeskilla ; fåtallig, - noteret ved Tibbevungen, 1993.

Tobladet Skilla ; fåtallig, - noteret 1993.

Narcisfamilien

Påskelilje ; hist og her.

Vintergæk ; hist og her.

Arumfamilien

Dansk Ingefær/Plettet Ingefær ; årligt en pæn bestand, - i Smørmosen.

Kær-Mysse ; fåtallig, - i Smørmosen.

Irisfamilien

Sibirisk Iris ; ny art for mosen, fåtallig, - i Fedtmosen.

Gul Iris ; alm.

Gøgeurtfamilien

Æg-Fliglæbe ; årligt en pæn bestand, - i Smørmosen.

Sump-Hullæbe ; ny art for mosen, fåtallig, - i Fedtmosen.

Skov-Hullæbe ; jvf. litt.

Vandplanter

Alm. Blærerod ; fåtallig, - noteret i Smørmosen, 1978-1980.

Tornet Hornblad ; ret alm.

Aks-Tusindblad ; jvf. litt.

Andemadfamilien

Liden Andemad ; alm.

Kors-Andemad ; alm.

Stor Andemad ; ret alm., noteret 1978-1993, - i Smørmosen.

Vandaksfamilien

Svømmende Vandaks ; alm.
Butbladet Vandaks ; jvf. litt.

Græs- Halvgræs - og Sivfamilien

Div. Græs-arter ; alm.
Alm. Hundegræs ; alm.
Mose-Bunke ; alm.
Bølget Bunke ; jvf. litt.
Eng-Rævehale ; alm.
Eng-Rottehale ; alm.
Røgræs ; noteret 1993.
Vellugtende Gulaks ; jvf. litt.
Knæbøjet Rævehale ; jvf. litt.
Alm. Hvene ; jvf. litt.
Eng-Rørhvene ; jvf. litt.
Fløjlsgræs ; jvf. litt.
Alm. Rajgræs ; jvf. litt.
Hjertegræs ; jvf. litt.
Lund-Rapgræs ; jvf. litt.
Alm. Rapgræs ; jvf. litt.
Blåtop ; jvf. litt.
Katteskæg ; noteret ved Tibbevangen, 1978-1993.
Draphavre ; jvf. litt.
Gold Byg ; ny art for mosen, fåtallig.
Alm. Kvik ; jvf. litt.
Sø-Kogleaks ; alm.

Alm. Sumpstrå ; jvf. litt.
Smalbladet Kæruld ; jvf. litt.
Tagrør ; alm.

Div. Siv-arter ; alm.
Lyse-Siv ; jvf. litt.
Glanskapslet Siv ; jvf. litt.
Tudse-Siv ; jvf. litt.
Knop-Siv ; ny art for mosen, alm.
Mark-Frytle ; noteret ved Kagsåengen, - syd for mosen, 1978-1980.
Mangeblomstret Frytle ; noteret 1978-1980.

Div. Star-arter ; alm.
Alm Star ; noteret 1978-1980.
Blære-Star ; noteret 1978-1980.

Stiv Star ; jvf. litt.
Top-Star ; jvf. litt.
Knippe-Star ; jvf. litt.
Håret Star ; jvf. litt.

Dunhammerfamilien

Bredbladet Dunhammer ; alm.
Smalbladet Dunhammer ; hist og her.

Padderokfamilien

Ager-Padderok ; alm.
Dynd-Padderok ; alm.
Kær-Padderok ; ny art for mosen, hist og her.

Engelsødfamilien

Kær-Mangeløv ; alm.

Tilføjede arter

Kokarteblomst ; årligt pæn bestand, på ruderat ved Tibbevungen.

Stenbrækfamilien

Saxifraga geum (hirsuta x umbrosa) ; mindre bestand, noteret 1979, 1980 og 1985, - i Smørmosen.

Indførte buske

Snebær ; alm.
Rævehalespiræa ; jvf. litt.
Pilebladet Spiræa ; ny art for mosen, - hist og her, - i Smørmosen.
Hvid Spiræa/Spiræa alba ; hist og her, - noteret i Smørmosen, 1978-1980.

Mosser etc.

(Fra litt. nævnes desuden ; St. Jomfruhår, Stiv Kransnål, Skør Kransnål, Nostoc pruniforme, Kost-Kløvtand, Stjernemos, Sod-Bredspidset - og Brodspidset Tørvemos, Alm. Kildemos, Skov-Tørvemos, Alm. Blegmos og Brunfiltet Stjernemos).

NB. : Udover ovennævnte floraliste henvises til Smør - og Fedtmosen 1999: Flora-rapport af Poul Evald Hansen, - jvf. særskilt rapport.

Frank Desting
Naturgruppen
2730 Herlev

E-mail ; dex@post8.tele.dk